

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
Cestal Plus Flavour tableta A.U.V.

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.  
H-1161 Budapest, Ottó u. 14.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.  
H-2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6.

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Cestal Plus Flavour tableta A.U.V.

Prazikvantel

Pirantel-embonát

Fenbendazol

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

**Hatóanyagok:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Prazikvantel     | 50,0 mg  |
| Pirantel-embonát | 144,0 mg |
| Fenbendazol      | 200,0 mg |

**4. JAVALLAT(OK)**

Kutyák valamennyi jelentős bélféreg-fertőzöttségének kezelésére:

Galandférgesség: *Echinococcus granulosus, Taenia spp., Dipylidium caninum* (fiatal alakok ellen is)

Orsóférgesség: *Toxocara canis, Toxascaris leonina* (fiatal alakok ellen is)

Kampósféreg-fertőzöttség: *Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala*

Ostorférgesség: *Trichuris vulpis*

**5. ELLENJAVALLATOK**

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

A készítmény alkalmazása 4 hetes életkor alatt nem ajánlott.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

A készítmény akut toxicitása > 2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns változást még ötszörös túladagolás esetén sem. Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

Kutya.

**8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

Adagolás:

10 testtömeg kilogrammonként 1 tableta

Kölykök és kistestű kutyák:

< 2 kg 1/4 tableta ,

2-5 kg 1/2 tableta

5-10 kg 1 tableta

Közepes testű kutyák:

10-20 kg 2 tableta

20-30 kg 3 tableta

Nagytestű kutyák:

30-40 kg 4 tableta

40-50 kg 5 tableta



**9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

Orális alkalmazás. A tableta közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, sajtkba, stb.) helyezve adható be. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.

A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő.

Az újrinfektózódás veszélye miatt a kezelést 3 havonta célszerű megismételni.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt száraz, fénytől védett helyen tartandó.

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

**Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

Az általános munkavédelmi óvrendszabályokat kell betartani!

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutató a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Prazikvantel, pirantel-embonát vagy fenbendazol iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

Az állatokat a tabletta beadása után 24 óráig javasolt zárt helyen tartani, és az ürített bélsarat, férgéket, féregízeket, petéket megsemmisíteni.

Javasolt az állat környezetét gyakran takarítani és fertőtleníteni, majd alaposan kezét mosni. A kezelést követő napokban a gyerekeket távol kell tartani a kutyáktól.

**Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás**

Vemhes állatok kezelésére is használható.

**Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók**

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonistá hatás miatt a készítmény nem alkalmazható piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen nem használható együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamisollal való együttes használatát.

**Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok ), ha szükséges**

A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni

## 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A Cestal Plus Flavour tabletta A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe.

## 14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2012. december 18.

## 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

**Csomagolás jellege és elemei:**

5x2 tabletta, 100x2 tabletta fóliacsíkban és papírdobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

**A forgalomba hozatali engedély száma**

3274/1/12 NÉBIH ÁTI (5x2 tabletta)

3274/2/12 NÉBIH ÁTI (100x2 tabletta)

**Rendelhetőség**

Állatorvosi rendelvény nélkül kiadható. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

